

Description d'un **Perideris** nouveau, provenant
du **Dahomey**,

PAR PH. DAUTZENBERG.

PERIDERIS LECHATIELIERI, Dautzenberg.

Testa imperforata, oblongo-turrita, solidula, parùm nitida. Spira conoidea, apice attenuata, obliquè striatula. Anfractus 7-8 convexiusculi, supernè turgidi; sutura linearis, non marginata. Anfr. ultimus peripherià carinà prominente cinctus. Apertura quadrata, $\frac{3}{8}$ longitudinis subæquans marginibus callo junctis. Columella callosa, verticalis, subtorta; labrum acutum. Color testaceo-lividus, flammis longitudinalibus nigris et albidis, punctisque fuscis irregulariter depictus. — Long. 62 mill.; diam. 27 mill.; apert. 23 mill. longa, medio 15 mill. lata.

Habitat in regione Africæ occidentalis « Dahomey », dictâ, prope fluminem Ouémé. (Specimen unicum legit cap. Le Chatelier).

P. D.

Diagnoses d'espèces nouvelles de **Mollusques Céphalopodes**,
recueillis dans le cours de l'**Expédition scientifique**
du **Talisman** (1883).

PAR P. ET H. FISCHER.

1. **OCTOPUS SPONSALIS**, P. et H. Fischer.

Corpus læve, purpureo-vinosum, concolor, maculis chromatophoris minutis tinctum. Caput versus latus internum oculorum tuberculis pluribus instructum. Acetabula parva, interstitiis diametro eorum æqualibus discreta, in tertia postica parte brachiorum majora, in vicinio oris fere maxima æquantia, in apice brachiorum minutissima sed perfecte formata. Brachia inæqualia, longitudine sic ordinata : 1, 2, 3, 4. Paria acetabulorum 63 in brachio dextro primo speciminis masculini, 64 in secundo, 22 in tertio (copulatorio), 53 in quarto. Brachium copulatorium subcylindricum; canaliculus spermaticus amplus,